

Data: ____/____/____

Preencher quando não houver etiqueta

Nome: _____

RG: _____ Idade _____

Convênio _____

Data _____ RA _____

ELEGIBILIDADE: Pacientes com Dor Torácica**LOCAL DO ÍNICIO DO ATENDIMENTO**PA { Triagem Unidade de Internação UTI Unidade Diagnóstico
 Sala de Enfermagem Recepção | Segurança

ENFERMAGEM

PRIMEIRO ATENDIMENTO

Horário da Queixa: ____h ____min.

Há quanto tempo está com Dor: ____h ____min.

1º ECG: ____h ____min.

RESULTADO Supra ST ou BRE novo ECG Isquêmico Normal ou InespecíficoSeguir Fluxo: 1 2 3 41) Acionado Hemodinamicista: Não Sim Horário: ____h ____min.2) Acionado Enfermagem/Hemodinâmica: Não Sim Horário: ____h ____min.

Abertura do Balão: Horário: ____h ____min.

MÉDICO


EXAMES LABORATORIAIS

Todos os casos com suspeita clínica de síndrome coronariana aguda deverão colher marcadores.

 Kit Dor Torácica - Mioglobina | CKMassa | Troponina

Horário da Coleta: ____h ____min. Horário do Resultado: ____h ____min.

CONDUTA Trombolise Cineangiocoronariografia AngioplastiaDestino: UI() UTI() Alta()**ALERTA:** Se supra ST ou BRE novo - Tempo para chegada na hemodinâmica menor que 90min (Tempo entre o ECG c/ supra ST ou BRE e início do procedimento).**METAS:** Tempo porta - ECG 10 min. | Tempo ECG Balão 90 min (Tempo entre primeiro atendimento e primeiro ECG)
Tempo porta - agulha (Tempo ideal para início de infusão do trombolítico é de 30 minutos) (Tempo entre primeiro ECG e início da infusão do trombolítico).


Referência Bibliográfica

Sociedade Brasileira de Cardiologia. I Diretriz de Dor Torácica na Sala de Emergência Arq Brás Cardial 2002;79 (sup II)